

## Avaliação clínica e epidemiológica de tumor desmoide em um Cancer Center Brasileiro

Cassia da Silva, Fábio Fernando Eloi Pinto, Celso Abdon Lopes de Mello.  
A.C. Camargo Cancer Center

### Introdução

O tumor desmoide (TD) é um tumor localmente agressivo, sem potencial de metástase e cursam com altas taxas de recidiva. O tratamento envolve terapia sistêmica, radioterapia e cirurgia. Recentemente a cirurgia tem sido substituída por outros métodos. No Brasil, não se tem uma estimativa precisa da incidência dos sarcomas de forma geral, tampouco sobre o tumor desmoide. Neste sentido, é importante ter conhecimento das características clínicas e epidemiológicas destes tumores, bem como os padrões de tratamento adotados. O objetivo primário é a Avaliação clínica e epidemiológica de pacientes com diagnóstico de tumor desmoide em centros de oncologia brasileiros.

### Casuística e Métodos






Este é um estudo observacional, retrospectivo, unicêntrico. Através da análise de prontuário, as informações foram coletadas e catalogadas em ficha padronizada (RedCap). As variáveis a serem analisadas, de forma sumária, são idade, sexo, comorbidades, histórico de neoplasia na família, medicamento em uso, topografia, tamanho da lesão, sintomatologia, biópsia pré tratamento, tipo de tratamento inicial e recidiva. Os critérios de inclusão são: diagnóstico confirmado, tratamento na instituição. Serão excluídos pacientes com dados clínicos incompletos. Análise estatística: Será realizada uma análise descritiva das variáveis, em que serão apresentadas as distribuições de frequência absoluta (n) e relativa (%) para as variáveis qualitativas, e as principais medidas resumo, como a média, desvio padrão, mediana, valores mínimo e máximo.

### Resultados

Foram avaliados 172 pacientes, sendo que a grande maioria foram da raça branca (55,8%), feminino (68,0%), possuíam convênio (80,2%), com antecedentes familiares (52,9%), primeiros sinais com Massa/Aumento de volume (62,2%), não tiveram tratamento Pré-operatório (82,9%), chegaram no hospital com doença loco-regional (72,5%), localizados em Partes moles (Tronco/Abdomen) (47,4%), fizeram cirurgia (70,8%) e não tiveram recidiva (71,9%), a maioria das recidivas foi local (25,1%) e 40,6% dos pacientes estão vivos com doença.

Apresentamos dados preliminares do estudo clínico e epidemiológico de tumores desmoide em um Cancer Center através da análise de base epidemiológica hospitalar. Estes dados podem nortear adequações nas recomendações de tratamento e acompanhamento de pacientes com diagnóstico de tumor desmoide, resultando, com isso, melhores resultados para os próprios pacientes. No momento são dados preliminares que necessitam ser validados com uma maior população a fim de se estabelecer o perfil socio-demográfico.

### Resultados



### Conclusões

### Contato

email: cassia.silva2004@gmail.com