

Estevo Contage Amin¹, Eduardo Berna Bertero¹, Rafael Favaro Ambar¹, Raul Loures¹, Lucas Martinucci De Oliveira¹, Wagner Aparecido Franca¹, Renato Panhoca¹, Luis Augusto Seabra Rios¹

¹ Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo - IAMSPE - São Paulo, Brasil

Introdução e Objetivo

A doença de Peyronie é uma condição que causa a formação de placas fibrosas no pênis, gerando uma curvatura que afeta a capacidade de penetração e impacta na satisfação sexual. A técnica de Yachia consiste em encurtar a parte convexa do corpo cavernoso através da incisão e plicatura na túnica albugínea contralateral à placa, sem sua excisão. O objetivo do estudo é analisar a satisfação dos pacientes tratados cirurgicamente por tal técnica.

Método

O estudo consiste em uma análise retrospectiva dos prontuários de pacientes com doença de Peyronie tratados cirurgicamente pela técnica de Yachia em um único centro entre 2016 e 2019. Estes homens apresentavam placas penianas estáveis por no mínimo 1 ano, e não haviam sido submetidos a colocação de prótese ou enxerto. Os pacientes foram avaliados por meio de questionários aplicados presencialmente, incluindo o International Index of Erectile Function - 5 (IIEF-5) e um Questionário de Satisfação Global (QSG) desenvolvido no serviço (Tabela 1).

Figuras

Questionário de Satisfação Global

Perguntas com notas de 0-10:

1. Você acha que a curvatura do pênis melhorou?

2. Você sente dor na hora da relação ?

3. O pênis se mantém duro para realizar atividade sexual ?

4. Você está satisfeito com a cirurgia ?

5. Você recomendaria essa cirurgia para alguém?

Pergunta com resposta sim ou não:

1. Você apresentou diminuição do pênis ?

Tabela 1

Resultados

Foram selecionados 35 pacientes, e 24 foram incluídos no estudo. A média de idade foi 59 anos, a maioria com curvatura dorsal (50%) e menor que 60° (62,5%). 87,% relataram uma diminuição da haste peniana e 50% apresentavam função erétil normal ou disfunção leve pelo IIEF-5. Todos os critérios do QSG obtiveram uma média de respostas positivas. As curvaturas dorsais/dorso-laterais apresentaram maior grau de disfunção erétil ($p < 0,003$). Os pacientes com curvatura superiores a 60° tendem a ficar mais satisfeitos com a cirurgia ($p 0.052$). Este grupo de homens também recomendariam a cirurgia a outras pessoas ($p 0.099$). Não houve correlação entre o grau de disfunção erétil e a satisfação com a cirurgia.

Conclusão

De acordo com o estudo, os pacientes ficaram satisfeitos com a corporoplastia principalmente aqueles com curvaturas maiores de 60° e nas dorsais/dorso-laterais. O grau de curvatura pré-operatória não impactou no resultado pós-operatório da função sexual. A diminuição da haste peniana é comum e não se correlacionou com a satisfação sexual. O QSG se mostrou uma ferramenta eficaz para avaliação dos resultados.

Referências

1. Jalkut M, Gonzalez-cadavid N, Rajfer J. Peyronie ' s Disease : A Review. 2003;5(3):142– 8.
2. Lopes I, Tomada N, Vendeira P. Penile corporoplasty with Yachia's technique for Peyronie's disease: Single center experience with 117 patients. Urol Ann [cited 2021 Dec 15]
3. Yachia D. Modified corporoplasty for the treatment of penile curvature. J Urol. 1990;143:80–82