

Taiane Rocha Campelo¹; Airton Batista Falqueti²; Leticia Matias Sampaio¹; Gabriel Bofante Scarpa Vasconcellos¹; Miriam Paniz Leal¹; Vanderlei Pereira Lima¹; Raphaela De Almeida Gazzoli¹; Rannysere Matias Sampaio¹; Diego Escobar¹; Alexandre Batista Falqueti¹.

Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro¹; Faculdade Metropolitana².

Introdução e Objetivo

Os Sarcomas compõem um grupo heterogêneo de tumores malignos, derivados do mesoderma. O sarcoma geniturinário é raro, cerca de 1 a 2% de todos os cânceres do trato urinário, e o de bexiga corresponde a 0,3%. A raridade de sarcomas do trato urinário é o maior obstáculo para o esclarecimento clínico e evolutivo do tumor.

O objetivo é relatar um caso raro de ocorrência e contribuir com a literatura.

Método

As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário e revisão da literatura.

Resultados

Paciente masculino, 78 anos, rim único funcional a direita, com relato de dor em andar inferior de abdome associado à disúria e diminuição do jato urinário há aproximadamente 3 dias.

Na admissão foi evidenciado hidronefrose associada a elevação de escórias nitrogenadas, sem sinais de urgência dialítica.

Foi submetido a cistoscopia de urgência com achado de bexiga trabeculada com presença de grande abaulamento vesical em assoalho e fundo que alterava a conformação anatômica vesical impedindo a visualização dos meatos ureterais. Foi então realizada nefrostomia direita para manejo de lesão renal e término de investigação diagnóstica.


Realizou investigação radiológica com achado de nodulação heterogênea com focos de necrose/liquefação de permeio, na pelve à direita, adjacente ao músculo obturador interno, sem clivagem com a parede vesical adjacente, medindo ao menos 6,7 x 6,0 x 3,6cm, estenosando o ureter local e determinando leve ureterohidronefrose a montante, associado a borramento dos planos adiposos marginais, sugerindo infiltração, padrão é compatível com linfonodomegalia metastática.

No estadiamento não foi evidenciado acometimento extra regional.

Foi submetido a laparotomia exploradora com ressecção de massa retrovesical em bloco com cuff de assoalho vesical e reimplante ureteral a direita sob técnica de Boari associado a Psoas Hitch.

Como resultado histopatológico foi evidenciado sarcoma de alto grau com extensas áreas de necrose, infiltração de parede ureteral, de tecido adiposo perivesical e margens cirúrgicas livres.

Figuras



Conclusão

Com este relato conclui-se que o sarcoma de bexiga pode se apresentar de forma atípica aos tumores de bexiga, bem como demonstra a importância de se documentar estes casos para que haja maior elucidação fisiopatológica e terapêutica.

Referências

1. KAMOUN, A. et al. A consensus molecular classification of muscle-invasive bladder cancer. *European Urology*, [S.l.], v. 77, p. 430, 2020.
2. JÚNIOR, Archimedes Nardozza; ZERATTI FILHO, A.; REIS, B. R. *Urologia fundamental*. São Paulo: Planmark Editora Ltda, 2010.