



XV CONGRESSO INTERNACIONAL DE

uro-oncologia

→ 17 a 20 de abril de 2024 | Sheraton WTC - SP

X Simpósio Multiprofissional de Uro-Oncologia



Análise epidemiológica e social dos pacientes com câncer de pênis submetidos a penectomia em um hospital de referência uro-oncológica no Sul de Minas durante a pandemia: um estudo abrangente.

Bia Yamashita Fonseca;¹ Volney Marques Passos;¹ Fabrizia Serra Pereira Guerrieri;¹ Allan Bruno Frade Bedetti;¹ Ricardo Vinicius Carvalho Teixeira¹; Antonio Carlos De Souza¹; Túlio Kersul De Souza¹; Alexandre Coelho Dos Santos¹; Luciana Bitencourt Carvalho¹

Introdução: Durante a pandemia, muitos hesitaram em procurar tratamento devido a preocupações com a exposição ao COVID-19, contribuindo para a acumulação de casos não resolvidos e atrasos nos procedimentos cirúrgicos planejados, bem como a diminuição do volume cirúrgico da totalidade dos serviços. Além disso, fatores como baixas condições socioeconômicas, falta de instrução, má higiene íntima, presença de fimose e possível associação com o papilomavírus humano são apontados como influências. Este estudo teve como objetivo analisar o perfil clínico-epidemiológico de pacientes submetidos a penectomia neste período. **Métodos:** Foi realizado um estudo de coorte observacional, descritivo, longitudinal e retrospectivo, utilizando dados de pacientes submetidos a penectomia entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022. **Resultado:** Dez pacientes foram submetidos a penectomia radical. A idade variou de 44 a 81 anos, com maior frequência entre 70- 89 anos: (40% casos). Em relação aos fatores de risco observou-se: histórico de tabagismo em 60%; fimose em 80%. Quanto ao nível sócio educacional, o grau de escolaridade mais alto encontrado na amostra era um único paciente com segundo grau completo, os demais se dividiram principalmente entre os com 1º grau completo (60%). **Conclusão:** Concluímos que a análise dos pacientes submetidos à penectomia durante a pandemia revelou desafios na saúde pública. A alta prevalência de tabagismo e fimose destaca a necessidade de medidas preventivas e educacionais. A faixa etária predominante sugere a importância da detecção precoce e acompanhamento médico regular em populações vulneráveis.

Esses resultados destacam a necessidade de adaptação dos serviços de saúde para garantir o acesso contínuo aos cuidados médicos, mesmo durante crises de saúde pública, evitando atrasos no diagnóstico e tratamento de condições graves como o câncer de pênis.

Gráfico de Faixa Etária





Gráfico da escolaridade



Referências

- Morais, J. L. P., Rosenstock, K. I. V., Maia, C. M. A. F. G., Santana, J. S. (2021). Saúde Do Homem E Determinantes Sociais Na Saúde Coletiva. Rev enferm UFPE on line. 2021;
- Nespoli, N. S., Vieira, B. M., Bertoldi, L. F. & Paiva, M. P. (2020). A penectomia e seus efeitos sobre a questão da masculinidade. Rio de Janeiro. Trivium - Estudos Interdisciplinares, 12(1), 53-67. P@pisc: Periódicos Eletrônicos em Psicologia.
- Oliveira, Leila & Santos, Mauro & Camacho, Alessandra & Soares, Raquel & Ramos, Raquel & Fully, Patricia. (2022). A percepção do paciente frente a Penectomia: uma revisão integrativa. Research, Society and Development.